Molusquicida
CARACOLEXMAX 6 GB
METALDEHIDO 6 GB

CARACOLEXMAX 6 GB Es un **MOLUSQUICIDA** de la familia **CICLO-OCTANO**

Ingrediente activo: **METALDEHIDO**

CARACOLEXMAX 6 GB actúa por contacto e ingestión. El metaldehído influye negativamente en los procesos en los que interviene la ATPasa para la producción de energía metabólica y la serotonina que controla la producción y la excreción de las mucosas. Rompe las paredes de las células productoras de mucus con lo que induce a una secreción creciente de moco y produce una degradación importante de las membranas y mitocondrias de los tejidos productores de moco, causando contracciones musculares, parálisis, deshidratación y muerte.

CARACOLEXMAX 6 GB No requiere equipo de aplicación, el producto se aplica de forma manual.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 7-15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 15 días.

PRESENTACIONES COMERCIALES: 400 GR

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

EL SALVADOR, PANAMÁ

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Frijol ***Phaseolus vulgaris***	Babosa del frijol ***Sarasinula plebeia***	6,4-10 kg/ha (4,5-7 kg/mz) Momento de aplicación: al ver las primeras babosas o caracoles o al observar los primeros síntomas de ataque.

Molusquicida
CARACOLEXMAX 6 GB
METALDEHIDO 6 GB

HONDURAS

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Ajo ***Allium sativum*** Café ***Coffea arabica***	Caracol de las huertas ***Cepaea hortensis*** Babosa gris del campo ***Deroceras agreste*** Babosa del frijol ***Sarasinula plebeia*** Caracol manchado ***Helix sp.***	6,4-10 kg/ha (4,5-7 kg/mz) Momento de aplicación: al ver las primeras babosas o caracoles o al observar los primeros síntomas de ataque.
Chile/Ají ***Capsicum spp.*** Lechuga ***Lactuca sativa*** Melón ***Cucumis melo*** Repollo ***Brassica oleracea var. capitata*** Tomate ***Solanum lycopersicum***	Caracol de las huertas ***Cepaea hortensis***	
Frijol ***Phaseolus vulgaris***	Babosa de vientre blanco ***Arion fasciatus*** Babosa oscura ***Arion subfuscus*** Babosa gris del campo ***Deroceras agreste*** Caracol manchado ***Helix spp.*** Babosa del frijol ***Sarasinula plebeia*** Caracolillo ***Zonitoides arboreus***	
Tabaco ***Nicotiana tabacum***	Babosa de vientre blanco ***Arion fasciatus*** Babosa oscura ***Arion subfuscus*** Babosa gris del campo ***Deroceras agreste*** Caracol manchado ***Helix aspersa*** Caracol de las huertas ***Cepaea hortensis*** Caracolillo ***Zonitoides arboreus***	

Molusquicida
CARACOLEXMAX 6 GB
METALDEHIDO 6 GB

GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Frijol ***Phaseolus vulgaris*** Soya, soja ***Glycine max*** Arveja ***Pisum sativum*** Haba ***Vicia faba***	Babosa del frijol ***Sarasinula plebeia***	6,4-10 kg/ha (4,5-7 kg/mz) Momento de aplicación: al ver las primeras babosas o caracoles o al observar los primeros síntomas de ataque.

MAXIAGRO

PBX: +502-2314-8989

E-mail: info@maxiagro.com.gt

Dirección: 1 Av. 3-05 Zona 9, Ciudad de Guatemala. 01009

2019 © MAXIAGRO, S.A. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. MAXIAGRO, S.A. no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento

Documento y versión: **FTC-CARACOLEXMAX 6 GB V.19.0**