1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

MAX TOP 32.5 SC

Fungicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	MAX TOP 32.5 SC
INGREDIENTE ACTIVO	Azoxistrobina, Difenoconazol
NOMBRE QUÍMICO	Azoxistrobina: methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate Difenoconazol: 3-chloro-4-[(2*RS*,4*RS*;2*RS*,4*SR*)-4-methyl-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
GRUPO QUÍMICO	Azoxistrobina: Estrobilurina Difenoconazol: Triazol
CONCENTRACIÓN	Azoxistrobina: 20.0% Difenoconazol: 12.5%
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	5

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL 32.5 SC es un fungicida sistémico y de contacto, con acción preventiva, protectante, curativa y antiesporulante. El contenido de azoxistrobina inhibe la respiración mitocondrial en los hongos y el contenido de difenoconazol aporta un efecto curativo, protector y erradicante al inhibir el desarrollo de los tubos germinativos de los hongos. Se mueve por el xilema (movimiento acropétalo) y tiene sistemicidad y movimiento translaminar, protegiendo las hojas y brotes nuevos

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Melón ***Cucumis melo***, Pepino ***Cucumis sativus***, Sandía ***Citrullus vulgaris***, Zucchini ***Cucurbita pepo***, Calabaza ***Cucurbita spp***., Chayote ***Sechium edule***

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Oidio ***Sphaerotheca fuliginea***, Mildiu polvoso ***Erysiphe cichoracearum***, Alternaria ***Alternaria alternata***, Antracnosis ***Colletotrichum orbiculare***, Tizón de la Hoja ***Alteria cucumerina***, Complejo del mal del talluelo ***Rhyzoctonia spp***., ***Sclerotium rolfsii, Fusarium spp***., ***Phytophthora spp***., ***Pythium spp***., ***Sclerotinia spp***., Mancha foliar por cercóspora ***Cercospora citrullina***, Tizón Gomoso ***Didymella bryoniae***, Roña ***Cladosporium cucumerinum***

DOSIS RECOMENDADA:

Para Guatemala: Melón, pepino, sandía, zucchini, calabaza, chayote: 0.35 L/ha.

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

COMPATIBILIDAD: El producto puede ser mezclado con la mayoría de productos agroquímicos comúnmente utilizados. Incompatible con insecticidas organofosforados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de efectuar la aspersión final.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: Melón, pepino, sandía, zucchini, calabaza, chayote: 7 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado (12 horas) para ingresar al área de cultivo. Si desea ingresar previamente utilice equipo de protección.

Fecha de modificación: 07-noviembre-2018