FICHA TÉCNICA

K-BROZIM DUO 25 SC

Fungicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	K-BROZIM DUO 25 SC
INGREDIENTE ACTIVO	Epoxiconazol, Carbendazim
NOMBRE QUÍMICO	Epoxiconazol: (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole
	Carbendazim: methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
GRUPO QUÍMICO	Epoxiconazol: Triazol
	Carbendazim: Benzimidazol
CONCENTRACIÓN	Epoxiconazol: 12,5%
	Carbendazim: 12,5%
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	III

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

K-BROZIM DUO 25 SC es un fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y protectiva. Es una mezcla de dos ingredientes activos: Epoxiconazol inhibe la síntesis del ergosterol y bloquea la enzima 14-dimetilasa, provocando el deterioro de la actividad de la membrana celular de los hongos ascomicetos, basodiomicetos y deuteromicetos. Carbendazim es absorbido por las raíces y tejidos verdes, con traslocación acropetálica. Actúa inhibiendo el desarrollo de tubos germinativos y crecimiento de micelio.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Arroz (*Oryza sativa*), Café (*Coffea arabica*), Maní (*Arachis hypogaea*)

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Arroz: Tizón de la hoja o Quemado del arroz (*Pyricularia oryzae*), Rhizoctonia (*Rhozoctonia solani*), Escalado de la hoja (*Rhynchosporium* sp.), Mancha marrón (*Helminthosporium oryzae*), (*Cercospora oryzae*), Complejo de manchado del grano (*Fusarium* spp.), (*Pyricularia* spp.), (*Curvularia* spp.), Quemado del arroz (*Pyricularia orizae*). **Café:** Roya (*Hemileia vastatrix),* Cercospora (*Cercospora coffeicola*), Ojo de gallo (*Mycena citricolor*), Phoma (*Phoma sp*). **Maní:** Roya (*Puccinia arachidis*), Cercospora (*Cercospora arachidicola*), Cercosporidium (*Cercosporidium personatum*).

DOSIS RECOMENDADA:
Para Honduras, El Salvador y Panamá : Arroz: 0.5-1.0 L/ha. Café y maní: 0.5 L/ha.
Para Guatemala: Arroz: 0.75-1.0 L/ha. Café: 0.5-0.55 L/ha.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba de física de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: Para arroz y maní 30 días, para café 40 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes de este tiempo, utilice equipo de protección personal.

Fecha de modificación: 08-mayo-2018

Dirección: Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China
Tel.: +502 2485-4111 | Fax.: +502 2484-3900 | Sitio web: www.rainbowchem.com