1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

PENDIMAX 50 EC

Herbicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Pendimax 50 EC
NOMBRE QUÍMICO	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
GRUPO QUÍMICO	Dinitroanilina
CONCENTRACIÓN	50% v/v
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	III

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

PENDIMETALINA 50 EC es un herbicida sistémico, residual, selectivo, de uso en pre y post-emergencia temprana para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha. Se absorbe por los tallos, las hojas y las raíces con traslocación basípeta. Inhibe el crecimiento de las malezas al interrumpir la división celular durante la mitosis tanto en los meristemos apicales como en los radiculares, provocando la muerte después de la germinación o la emergencia del suelo. Su efecto sobre malezas de hoja ancha ejerce con mayor acción sobre plántulas pequeñas (1-2 hojas).

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Arroz ***Oryza sativa***, Caña de azúcar ***Saccharum officinarum***, Maíz ***Zea mays***, Sorgo ***Sorghum vulgare***

MALEZAS QUE CONTROLA: Caminadora ***Rottboelia cochinchinensis***, Zacate Rugoso ***Ischaemum rugosum***, Pasto Guinea ***Panicum maximun***, Zacate Johnson ***Sorguhm halepense***, Pajilla ***Leptochloa filiformis***, Zacate Honduras ***Ixophorus unisetus***, Arrocillo ***Echinochloa crus-galli***, Digitaria ***Digitaria sanguinalis***, Liendre de Puerco ***Echinochloa colonum***, Cola de Zorro ***Setaria* spp.**, Digitaria ***Digitaria horinzontalis***, abrojo ***Cenchrus* spp.**, Pata de Gallina, Zacate pata de gallina ***Eleusine indica***, Bledo ***Amaranthus* spp**., Verdolaga ***Portulaca oleracea***, lengua de vaca ***Rumex crispus***, Zacate de agua ***Echinochloa colona***, Mozote ***Bidens pilosa***, Coquillo ***Cyperus iria***, Pasto guinea ***Panicum maximum***, Hierba amarga ***Parthenium hysterophorus***, Amor seco ***Bidens pilosa***.

DOSIS RECOMENDADA:

En Guatemala: Caña de azúcar, maíz, sorgo y arroz: 2.0-3.0 L/ha

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con propanil, 2,4-D, atrazina, diuron, fluometuron, graminicidas, hormonales y sulfonilureas. No mezclar con agroquímicos de fuerte reacción alcalina y oxidantes fuertes. Se recomienda realizar previamente a mezclas y aplicación una prueba de compatibilidad física y biológica a pequeña escala.

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a las dosis, los cultivos e intervalos de aplicación recomendados

PERÍODO DE CARENCIA: 60 días

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que la aplicación haya secado para ingresar al área de cultivo. Si desea ingresar previamente utilice equipo de protección.

Fecha de modificación: 11-octubre-2018