1Av. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

ATRAZINA 80 WP

Herbicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	Atrazina 80 WP
INGREDIENTE ACTIVO	Atrazina
NOMBRE QUÍMICO	*6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine*
GRUPO QUÍMICO	Triazina
CONCENTRACIÓN	80% p/p
FORMULACIÓN	Polvo mojable (WP)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

ATRAZINA 80 WP, es un herbicida sistémico usado en pre y post-emergencia para el control de gramíneas y malezas de hoja ancha. Es absorbido por las raíces y hojas de malezas impidiendo su desarrollo al inhibir el proceso fotosintético.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Caña de azúcar ***Saccharum officinarum***, Maíz ***Zea mays***, Sorgo ***Sorghum vulgare***, Piña ***Ananas comosus***.

MALEZAS QUE CONTROLA: Paja mona ***Leptochloa filiformis***, Guardarocío ***Digitaria sanguinalis*** Liendre puerco o arrocillo ***Echinochloa colonum***, Cadillo ***Cenchrus brownii***, Verdolaga ***Portulaca oleracea*** Botoncillo ***Caperonia palustris***, Croto ***Croton lobatus***, Escoba lechosa ***Euphorbia heterophylla*** Batatilla o campanilla ***Ipomoea spp***, Escoba negra ***Sida acuta***, Amor seco ***Bidens pilosa***, Bledo ***Amaranthus spp.***, Verdolaga de astilla ***Talinum triangulare***, Lechuguilla ***Talinum paniculatum***, Rabo de gato ***Acalypha alopecuroides***, Abrojo ***Cenchrus echinatus***, Pasto para ***Brachiaria spp.***, Gramalote ***Panicum fasciculatum*** Zacate azul ***Poa anua***, Cola de zorro ***Setaria spp***, Zacate casamiento ***Eragrostis mexicana***, Bledo ***Amaranthus hybridus***, Mielcilla o cominillo ***Galinsoga parviflora***, Lechilla o palo de leche ***Euphorbia spp***., Campanilla o churristate ***Ipomoea spp.***, Flor amarilla ***Melampodium divaricatum***, Pata de gallina ***Eleusine indica***, Zacate de agua ***Echinochloa crus-galli***, Mozote ***Bidens spp***, Apazote ***Chenopodium álbum***

DOSIS RECOMENDADA:
Para Guatemala: Caña de azúcar 2.0-3.5 kg/ha. Maíz y Sorgo 1.5-3.0 kg/ha.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de uso común con excepción de aquellos con reacción fuertemente ácido o alcalino. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previo a la mezcla-aplicación.

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: 60 días.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Hasta que seque el producto. Si necesita ingresar previamente utilice el equipo completo de protección personal

Fecha de modificación: 07-mayo-2019