1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

CONDAMAX 55 EC

Insecticida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	CONDAMAX 55 EC
INGREDIENTE ACTIVO	CHLORPYRIFOS, CYPERMETHRIN
NOMBRE QUÍMICO	*O,O*-diethyl *O*-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate (*RS*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
GRUPO QUÍMICO	ORGANOFOSFORADO, PIRETROIDE
CONCENTRACIÓN	55% m/v
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd; Rainbow Agrosciences Panama, S.A.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	III/4

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

REMATE 55 EC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, inhalación e ingestión. Bloquea el sistema nervioso del insecto por la inhibición de la acetilcolinesterasa, ocasionando su muerte.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Tomate ***Lycopersicon esculentum*****,** Pimentón ***Capsicum annuum*****,** Berenjena ***Solanum melongena*****,** Papa ***Solanum tuberosum*****,** CRUCIFERAS: Repollo, Coliflor, Brócoli, Col de Bruselas ***Brassica*** *spp*., Algodón ***Gossypium hirsutum*****,** Cítricos ***Citrus*** *sp*., Café ***Coffea arabica*****,** Maiz ***Zea mays***, Sorgo ***Sorghum vulgare*****,** Arroz ***Oryza sativa*****,** Ajo ***Allium sativum***, Cebolla ***Allium cepa,***

PLAGAS QUE CONTROLA: Minador ***Lyriomiza*** *spp*. Gusano del fruto ***Spodoptera frugiperda***, Afidos ***Aphis*** *spp*., Cortadores ***Agrotis*** *spp*., Pulguilla ***Epitrix*** *spp*., Polilla guatemalteca de la papa ***Tecia solanivora*****,** Polilla de las brásicas ***Pieris rapae***, Gusano falso medidor de la col ***Trichoplusia ni***, Palomilla dorso de diamante ***Plutella xylostella*****,** Gusano bellotero ***Helicoverpa zea*****,** Minador de los cítricos ***Pyllocnistis citrella*****,** Minador de la hoja del café ***Leucoptera coffeella*****,** Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda*****,** Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda*****,** Minador de las hojas ***Liriomyza huidobrensis***, Trips ***Thrips tabaci*****,**

DOSIS RECOMENDADA:

Para Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá: Tomate, pimentón, berenjena: 560-868 mL/ha (392-608 mL/mz); papa: 0,25-0,5 L/ha (0,18-0,35 L/mz); Repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas: 450-900 mL/ha (315-630 mL/mz); Algodón: 1,0-1,5 L/ha (0,7-1,1 L/mz); Cítricos: 1 Litro/ 400-600 litros de agua; Maíz, sorgo: 0,75-1,0 L/ha (0,53-0,7 L/mz); Arroz: 0,3 L/ha (0,2 L/mz); Ajo, Cebolla: 0,5-1,0 L/ha (0,35-0,7 L/mz).

Para Nicaragua: Maíz: 0,5-1,0 L/ha (0,35-0,70 L/mz)

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No es compatible con producto de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa a la mezcla y aplicación final.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: Para tomate, pimentón y berenjena: 7 días. En papa y cebolla: 15 días. Para repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas: 14 días. Para algodón, café, arroz, maíz y sorgo: 21 días. Para cítricos: 28 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

Fecha de modificación: 20-agosto-2018