1Av. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

CUROMAX 55 EC

Insecticida, Acaricida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	CUROMAX 55 EC
INGREDIENTE ACTIVO	Profenofos + Lufenuron
NOMBRE QUÍMICO	(*RS*)-(*O*-4-bromo-2-chlorophenyl *O*-ethyl *S*-propyl phosphorothioate) (*RS*)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6 difluorobenzoyl)urea
GRUPO QUÍMICO	Organofosforado, Benzoilurea
CONCENTRACIÓN	50% p/v, 5% p/v
FORMULACIÓN	Concentrado emulsionable (EC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	II

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

PROFENOFOS + LUFENURON 55 EC es un insecticida de contacto y translaminar. Inhibe la acetilcolinesterasa y la síntesis de quitina, lo que provoca que los insectos dejen de alimentarse y las larvas dejan de madurar. Posee acción ovicida. Es efectivo contra larvas pequeñas y grandes, asì como los adultos de la plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Maíz ***Zea mays***, Maní ***Arachis hyogaea,*** Café ***Coffea arabica,*** Yuca ***Manihot esculenta,*** Repollo ***Brassica oleracea var. Capitata*** Soja ***Glycine max.***

PLAGAS QUE CONTROLA: Gusano cogollero ***Spodoptera spp.,*** Oruga defoliadora ***Anticarsia spp.***, Falso medidor ***Trichoplusia spp.*** Broca del café ***Hypothenemus hampei***, Oruga defoliadora ***Anticarsia gemmatalis***, Falso medidor ***Pseudoplusia includens***, Ácaro rojo ***Tetranychus desortorum***, Palomilla dorso de diamante ***Plutella xylostella***

DOSIS RECOMENDADA:

Para Guatemala: Maíz: 0,2-0,3 L/ha

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de insecticidas neutros de uso agrícola. No mezclar con agroquímicos de fuerte reacción alcalina o ácidos fuertes. Se recomienda realizar previamente a mezclas y aplicación una prueba de compatibilidad física y biológica a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: No es fitotòxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: Maíz: 35 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado, aproximadamente 12 horas, si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de protección personal.

Fecha de modificación: 3-enero-2019