FICHA TÉCNICA

LEAFMAX 60 WP

Herbicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE COMERCIAL	Leafmax 60 WP
INGREDIENTE ACTIVO	Metsulfuron metil
NOMBRE QUÍMICO	methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
GRUPO QUÍMICO	Sulfonilurea
CONCENTRACIÓN	60% p/p
FORMULACIÓN	Polvo mojable (WP)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

METSULFURON METIL 60 WP, actúa en forma sistémica y residual, siendo absorbido por el follaje y el sistema radicular para ser traslocado a toda la planta. Es recomendado para el control de malezas de hoja ancha en cereales, caña de azúcar y pastos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Caña de azúcar ***Saccharum officinarum***, Arroz ***Oryza sativa***, Trigo ***Triticum* spp**, Potreros.

MALEZAS QUE CONTROLA: Verdolaga ***Portulaca oleracea***, Frijolillo ***Phaseolus lathyroidas***, Uchuva ***Physallis sp.*** , Batatilla ***Ipomoea congesta, H. flirta***, Bledo ***Amaranthus hybridus***, Cosa-cosa ***Sida carpinofolia***, Lechecilla ***Euphorbia spp.***, Escoba ***Melochia pyramidata***, Meloncillo ***Cucumis melo***, Pega pega ***Desmodium tortuosum***, Yerba mora ***Solanum nigrum***, Verbena morada ***Stachyrarpheta cayenensis***, Botoncillo ***Eclipta alba,*** Friega platos ***Walteria indica***, Helecho ***Pteridium aquilinum***, Balsilla ***Eupatorium odoratum***, Modino blanco ***Clidemia hirta***, Rabo de raton ***Achyranthes indica***, Escobillo ***Sida acuta***, Dormilona ***Mimosa pigra***, Clavo de agua ***Jussisea sp***, Tripa de pollo ***Euphorbia hirta***, Lechosa ***Euphorbia heterophylla***, Palo de agua ***Ammania coccinea***, Mangona ***Commelina difusa***, Buche de gallina ***Heteranthera raniformis***.

DOSIS RECOMENDADA:
Para Guatemala: Caña de azúcar, arroz y trigo: 15 gramos/ha. Potreros: 1.5-3.0 gramos por cada 20 L de agua.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas usados en el mercado con excepción de los productos alcalinos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: Aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso no causa fitotoxicidad alguna.

PERÍODO DE CARENCIA: Por el tipo de producto y época de aplicación no se tiene restricción alguna

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere 24 horas para entrar al área tratada. En pastos esperar 15 días para el reingreso del ganado.

Fecha de modificación: 04-abril-2018