MANCOZEB 80 WP

Fungicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	MANCOZEB 80 WP
NOMBRE QUÍMICO	manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
GRUPO QUÍMICO	Ditiocarbamato
CONCENTRACIÓN	Mancozeb: 80% p/p
FORMULACIÓN	Polvo mojable (WP)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Indofil Industries Limited
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	Dominicana: III, Otros: IV

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

MANCOZEB 80 WP es un fungicida de amplio espectro, de contacto y protectante, con actividad preventiva y curativa. Inhibe la germinación de las esporas deteniendo el desarrollo del tubo germinativo y la formación de apresorios; por su acción multisitio afecta los procesos de respiración y generación de ATP, afecta el metabolismo de la glucosa, la oxidación de los ácidos grasos y de los aminoácidos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Tomate (*Lycopersicon esculentum* mill), Ajo (*Allium sativum*), Papa (*Solanum tuberosum)*, Cebolla (*Allium cepa)*, Frijol (*Phaseolus vulgaris*), Melón (*Cucumis melo),* Pepino (*Cucumis sativus*), Banano y plátano (*Musa* spp.), Papaya (*Carica papaya),* Mani (*Arachis hypogaea*), Arroz (*Oryza sativa*), Tabaco (*Nicotina tabacum*), Apio (*Apium graveoluns*), Brócoli (*Brassica spp.),* Berenjena (*Solanum melongena,* Café (*Coffea arabica*), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), Calabaza (*Cucurbita sp*), Avena (*Avena sativa*), Chile (*Capsicum annum*).

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Tizón temprano (*Alternaria solani*), Tizón tardío (Phytophthora infestans), Mal del talluelo o pudrición humeda (Rhizoctonia solani), Antracnosis (*Colletotrichum phomoides*), Mancha púrpura (*Alternatia porri*), Mildiu (*Peronospora destructor), Stemphyllium cercosporidium*), Tizón (*Botrytis squamosa*), Antracnosis (*Colletotrichum* sp.), Mildiú velloso (*Phytophtora phascoli*), Tizón (*Alternaria cucumeris*), Antracnosis (*Colletotrichum* spp), Pobredumbre o pudrición del fruto (*Phytophthora* sp), Mildiu velloso (*Pseudoperonospora cubensis*), Quema de la hoja o piricularia (Pyricularia oryzae), Helmintosporium o mancha circular (*Helminthosporium oryzae*), Sigatoka amarilla (*Mycosphaerella musicola*), Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijensis var. difformis*), Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*), Cerosporiosis (*Cercospora arachidicola),* Mancha de la hoja (*Alternaria sp*), Moho azul (*Peronospora tabacina*), Mancha de cercospora (*Cercospora oryzae*), Botritis (Botrytis spp.),Antracnosis (Gloesporium melongenae), Mancha (Cerscorpora personata.), Mancha de hierro (Cercospora coffeicola.), Alternaria (Alternaria cucumerina.) Antracnosis (Colletotrichum lagenarium.) Cercospora (Cercospora citrulina.) Mildiu velloso (Mycosphaerella citrulina) Gomosis de tallo (Cladosporium cucumerinum.), Botritis (Botrytis spp.).

DOSIS RECOMENDADA:

Para Dominicana: tomate, ajo, papa, cebolla, frijol, melón, pepino, banano y plátano, papaya, maní, arroz, tabaco, apio, brócoli, berenjena, café, caña de azúcar, calabaza y avena: 0.5-2.20 kg/200L de agua/ha.
Para Guatemala: Arroz: 2.5-4.5 kg/ha. Avena, apio, berenjena, brócoli: 2.0-2.5 kg/ha. Ajo y cebolla: 2.5-3.0 kg/ha. Maní: 1.5-2.5 kg/ha. Café: 3.0 kg/ha. Caña de azúcar y calabaza: 2.5-3.5 kg/ha.
Para El Salvador: Papa, tomate, chile, berenjena: 2.0-2.5 kg/ha.
Para Nicaragua: Papa, tomate, cebolla: 1 – 1.5 Kg/200 L de agua, Arroz: 5 kg/ 80-120 L de agua; Banano y plátano: 1.8-2.5 Kg + 16 L de agua + 3.5 L de aceite.

FICHA TÉCNICA

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados. Se recomienda no mezclar polisulfuros y abonos foliares que contengan boro.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: 14 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas. En caso necesario de reingreso al área tratada durante el periodo utilice el equipo de protección completo.

Fecha de modificación: 03-mayo-2018