1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

MAXAZO 50 WG

Fungicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	Maxazo 50 WG
INGREDIENTE ACTIVO	Azoxistrobina
NOMBRE QUÍMICO	methyl (*E*)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate
GRUPO QUÍMICO	Estrobilurinas
CONCENTRACIÓN	50% p/p
FORMULACIÓN	Gránulos dispersables (WG)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

AZOXISTROBINA 50 WG, es un fungicida de amplio espectro, con acción preventiva, sistémica, curativa y erradicante. Inhibe la germinación de las esporas y estados tempranos de desarrollo de los hongos, crecimiento del micelio y la esporulación. La actividad fungicida de Azoxistrobina 50 WG es dada por la inhibición de la respiración mitocondrial en el hongo. Esto se logra al evitar la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Café **Coffea arabica**, Arroz **Oryza sativa**, Melón **Cucumis melo**,_Sandía **Citrullus vulgaris**, Pepino **Cucumis sativus**, Cebolla **Allium cepa**, Tabaco **Nicotiana tabacum**, Mango **Manguifera indica**.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Café: Antracnosis ***Colletotrichum lagenarium***, Ojo de gallo ***Mycena citricolor***, Cercospora ***Cercospora coffeicola***. Roya ***Hemileia vastatrix***.

Arroz: Tizón de la hoja ***Pyricularia oryzae***, Rizoctonia ***Rhizoctonia sp.***, Escaldado de la hoja ***Rhynchosporium sp.***, Mancha marrón ***Helmintosporium oryzae***

Melón, sandía y pepino: Mildiu velloso ***Pseudoperonospora cubensis***, Mildiu polvoso ***Erysiphe sp.***, Fusarium ***Fusarium spp.***, Alternaria ***Alternaria spp***, Gomosis ***Didymella bryoniae***.

Cebolla: Alternaria ***Alternaria spp***, Mildiu ***Peronospora destructor***

Tabaco: Moho azul ***Peronospora tabacina***, Otras enfermedades foliares: ***Cercospora nicotinae, Alternaria tabacina, Phytophtora nicotianae var parasítica***.

Mango: Antracnosis ***Colletotrichum gloesporoides***

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

DOSIS RECOMENDADA:

Para Guatemala y El Salvador: Café: 100-150g/ha. **Arroz:** 250-300g/ha. **Mango:** 200-400g/ha.

Para Honduras: Café: 150-200g/ha. **Arroz:** 250-300g/ha. **Melón, sandía, pepino y tabaco:** 200g/ha **Cebolla:** 30-40g/100L de agua.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos agrícolas, sin embargo es necesario realizar pruebas previas. No se mezcle con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad según instrucciones de uso.

PERÍODO DE CARENCIA: 2 días

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar hasta que el producto haya secado sobre el follaje del cultivo tratado.

Fecha de modificación: 07-noviembre-2018