DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
1ª Av. 3-05, Terminal zona 9
Ciudad de Guatemala
Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

MAXCONIL 90 WG

Fungicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	MAXCONIL 90 WG
INGREDIENTE ACTIVO	Clorotalonil
NOMBRE QUÍMICO	tetrachloroisophthalonitrile
GRUPO QUÍMICO	Benzonitrilo halogenado
CONCENTRACIÓN	90% m/m
FORMULACIÓN	Gránulos dispersables (WG)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV / 5

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Clorotalonil 90 WG. Es un fungicida de contacto, protectante, foliar, no sistémico, de acción preventiva y de amplio espectro. Se aplica a los órganos aéreos de las plantas (tallos, hojas y frutos). Se acumula rápidamente en las células del hongo, provoca inhibición de la respiración de las células fúngicas que conlleva a un retraso en el crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las esporas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Banano y plátano ***(Musa spp)***, Frijoles **(Phaseolus sp)**, Frijoles (seco) **(Phaseolus sp),** Col o Repollo **(Brassica olerace)**, Brócoli **(Brassica oleracea)**, Maíz (dulce) **(Zea Mays)**, Cebolla **(Allium cepa L.)**, Papa o patata **(Solanum tuberosum)**

CONTROL:

Sigatoka negra ***Mycosphaerella fijiensis*** Sigatoka amarilla ***Mycosphaerella musicola,*** Roya ***Uromyces appendiculatus*** Moho gris ***Botrytis blight*** Anthracnosis ***Colletotrichum sp. Gloeosporium sp.*** Mancha foliar ***Alternaria sp.*** Ring spot ***Leptosphaerulina australis*** Roya de hoja ***Helminthosporium*** Surcos ***Uromyces appendiculatus*** Roya de la hoja o soplo ***Botrytis sp.*** Roya temprana y tardía ***Botrytis sp.***

DOSIS RECOMENDADA:

Para Honduras: Banano y plátano: 1.32-3.53 lbs/ha. Frijoles: 2.78 a 6.18 lbs/ha. Frijoles (seco): 2.78 a 4.02 lbs/ha. Col o Repollo: 3.09 lbs/ha. Brócoli: 4.02 lbs/ha. Maíz (dulce): 3.09 a 4.02 lbs/ha. Cebolla: 3.09 a 6.18 lbs/ha. Papa o patata: 12.35 a19.77 lbs/ha.

Para Guatemala: Banano y plátano: 0,6-1,4 Kg/ha

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con productos agrícolas de uso común, excepto con aquellos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente a mezclas y aplicación una prueba de compatibilidad física y biológica a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: Banano y plátano: 0 días. Frijol, repollo, brócoli, papa: 7 días. Frijol seco, maíz dulce y cebolla: 14 días

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Ingresar cuando la aspersión se haya secado (aproximadamente 12 horas). Si es necesario ingresar previamente utilice el equipo de protección personal.

Fecha de modificación: 24-marzo-2023