1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

MAXFOS 48 EC

Insecticida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	Maxfos 48 EC
INGREDIENTE ACTIVO	Clorpirifos
NOMBRE QUÍMICO	*O,O*-diethyl *O*-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
GRUPO QUÍMICO	Organofosforado
CONCENTRACIÓN	48 % p/v
FORMULACIÓN	Concentrado emulsionable (EC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	II

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

CLORPIRIFOS 48 EC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, inhalación e ingestión; ocasionando disturbios en el sistema nervioso de los insectos por la inhibición de acetilcolinesterasa.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Arroz (*Oryza sativa),* Papa (*Solanum tuberosum),* Tomate (*Lycopersicon esculentum*), Maíz (*Zea mays*), Banano y plátano (*Musa* sp.), Algodón (*Gossypium sp*), Chile (*Capsicum annum*), Pepino (*Cucumis sativus*), Cítricos (*Citrus spp*), Sorgo (*Sorghum vulgare*), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), Tabaco (*Nicotiana tabacum*), Piña (*Ananas comosus),* Café (*Coffea arabica*). Ornamentales.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Arroz: Sogata (Sogatodes oryzicola), Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), Novia del arroz (Rupella albinella), Chinche del arroz (Blissus leucoptera), chinche verde (Nezara viridula). Papa: Minador (Liriomyza sativa), Polilla de la papa (Scrobipalpopsis solanivora). Maiz: Cogollero (*Spodopotera frugiperda,* S. *exigua*., *Heliothis zea*). Banano: Picudo negro (Cosmopolitas sorditus.). Tomate:Minador (Lyriomiza spp). Gusano del fruto (Spodoptera frugiperda), Afidos (Aphis spp.), Cortadores (Agrotis spp.).Algodón: Gusano soldado (*Spodoptera sunia*) y Gusano de la hoja (*Alabama spp*). Chile: Gusano soldado (Spodoptera exigua), Gusano trozador (Spodoptera ornithogalli), Afidos (Aphis spp.), Cortadores (Agrotis spp.).Pepino: Minador de la hoja (*Liriomyza spp.).* Cítricos: Arador de los cítricos o negrilla *(Phyllacoptruta oleivora).*Sorgo: mosquita midge (Contarinia sorghicola), Gusano soldado (*Spodoptera exigua*), Gusano de la hoja (*Alabama spp.*). Caña de azúcar: Mosca pinta (*Aeneolamia postica*). Tabaco: Cogollero del tabaco (*Heliothis virencens*), Melaito (*Myzus persicae*). Piña: Cochinilla (*Plasmococcus brevipes*). Café: Cochinilla (*Plasmococcus brevipes*), Broca del café (*Hypothenemus hampei*). Ornamentales.

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

DOSIS RECOMENDADA:

Para Panamá y El Salvador: Arroz: Sogata 0.5-1.50 L/ha. Papa: 1.0 – 1.5 L/ha. Maiz: 0.8 – 1.0 L/Ha. Algodón: Gusano soldado 2.00-2.50 L/ha y Gusano de la hoja 1.00-1.50 L/ha. Banano: 6 mL en 30-40 mL de agua por cepa. Tomate: 0.5 – 1.0 L/ha. . Chile: 1.0-1.5L/ha. Pepino: 1.0-1.75 L/ha. Cítricos: 0.75-1.0 L/ha. Sorgo: 0.3-1.0L/ha.

Para Guatemala: Maíz y Sorgo: 0.5-1.5 L/ha. Arroz y Caña de azúcar: 1.0-1.5 L/ha. Banano y plátano: 6ml de producto diluido en 30 a 40 ml de agua por cepa. Papa: 1.5-2.5 L/ha. Tomate: 1.5-2.0 L/ha.

Para República Dominicana: Banano: 6 mL en 30-40 mL de agua por cepa. Tabaco: 0.8-1.0 L/ha. Piña: 1.0-1.5 L/ha. Café: 1.0-1.5 L/ha. Ornamentales: 1.0-1.5 L/ha.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En cultivo de arroz, cuando se haya aplicado PROPANIL se debe esperar de 8 a 10 días antes de aplicar CLORPIRIFOS 48 EC. No mezclar con productos altamente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa a la mezcla y aplicación final.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

PERÍODO DE CARENCIA: Banano y plátano: 0 días. Ornamentales: Sin restricción. Otros cultivos: 21 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que la aspersión haya secado (aproximadamente 6 horas), si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de protección personal.

Fecha de modificación: 17-septiembre-2018