1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

MAXIAGRO
MAXIMIZANDO SU INVERSIÓN

PICLOMAX 30.4 SL

Herbicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	PICLOMAX 30.4 SL
INGREDIENTE ACTIVO	2,4-D + Picloram
NOMBRE QUÍMICO	(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
GRUPO QUÍMICO	Fenoxi Piridina
CONCENTRACIÓN	24,0+6,4% p/v
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Ltd
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

2,4-D + PICLORAM 30.4 SL, es un herbicida, selectivo, sistémico y post emergente que actúa sobre las partes verdes de las plantas. Recomendado para controlar malezas de hoja ancha o perennes, hierbas y arbustos que crecen en los potreros y pastizales, zonas industriales, cultivos agrícolas. Es absorbido por las hojas y la raíz de las plantas tratadas, se mueve a través del floema y xilema ejerciendo su acción herbicida sobre los ácidos nucleicos de la planta. En los tejidos meristemáticos ocasiona elongación celular, malformaciones y rompimiento de tejidos y en las hojas produce efectos násticos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Arroz ***Oryza sativa***, Caña de azúcar ***Saccharum officinarum***, Maíz ***Zea mays***, Pastos y potreros.

MALEZAS QUE CONTROLA: Bicho ***Cassia tora***, Dormidera, dormilona ***Mimosa pudica***, Zarsa ***Mimosa pigra***, Pata de paloma ***Croton hirtus***, Bledo ***Amaranthus spp,*** Verbena ***Stachytarpheta cayennensis***, Rabo o cola de alacrán ***Heliotropium indicum***, Flor amarilla, ***Melampodium spp***. Huizache ***Acacia farnesiana***, Cornizuelo ***Acacia corigera***, Escobilla ***Sida rhombifolia***, Viborana ***Asclepias curassavica***, Cinco negritos ***Lantana camara***, Rábano **Raphanus sativus L**, Lengua de vaca ***Rumex crispus***.

DOSIS RECOMENDADA:

Para Guatemala: Arroz, Caña de azúcar, maíz, pastos y potreros: Aplicación foliar total: 3-6 L/ha en 200-400 L de agua, Aplicación en parchoneo: 1-2 L en 100 L de agua, Aplicación al tocón: 800mL en 20 L de agua.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos derivados del petróleo y aceite quemado. No se recomienda mezclarlo con otros plaguicidas.

1AV. 3-05 Terminal zona 9,
Ciudad Capital, Guatemala
PBX: 2314-8989
E-MAIL: info@maxiagro.com.gt
www.maxiagro.com.gt

FITOTOXICIDAD: No es fitotoxico a las dosis y a los cultivos recomendados. Puede ser fitotoxico para cultivos susceptibles como la papa, el chile, tomate, papaya, etc. anuales o perennes de hoja ancha. Esto no sucede si se siguen las indicaciones de aplicación.

PERÍODO DE CARENCIA: Se aplica únicamente en los primeros estadios del cultivo. No aplique 12 días antes de la cosecha. En el caso de potreros y pastizales, después de la aplicación deje al menos 14 días sin pastorear los animales.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas para cultivos. En potreros y pastizales, se debe esperar un mínimo de 14 días antes de permitir el ingreso de animales.

Fecha de modificación: 29-enero-2019